

1. und 2. Lebensjahr
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Monaten)

Kinder und Jugendliche
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Jahren)

Erwachsene
(Impfbeginn/zeitpunkt im Alter von ... Jahren)

	BCG	Rota	T/D	Pa	Hib	Polio	HepB	Pneu	MenB	MenC	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV
Belgien		2	2	2	2	2	2	2		15				12	
Dänemark			3	3	3	3	• vorübergehend	3						15	
Deutschland		1	2	2	2	2	2	2		12				11	11
Finnland		2	3	3	3	3		3				6		12	
Frankreich			2	2	2	2	2	2		5				12	
Griechenland	4 J	2	2	2	2	2	2	2		2			12	12	12
Großbritannien		2	2	2	2	2	2	2	2	12				12	
Irland	0	2	2	2	2	2	2	2	2	6				12	
Italien		2	2	2	2	2	2	2	2	12				12	12
Luxemburg		2	2	2	2	2	2	2		13				12	12
Malta			1	1	1	1	12					6		13	
Niederlande			2	2	2	2	2	2		14				14	
Norwegen		1	3	3	3	3	3	3						15	
Österreich		1	2	2	2	2	2	2	2	12	12	6 (2x)	12	9	12
Portugal			2	2	2	2	2	0	2	12				12	
Schweden			3	3	3	3	3	3						18	
Schweiz			2	2	2	2	2	2	2	2				12	
Spanien			2	2	2	2	2		2	4				12	15
Zypern			2	2	2	2	2	2		12				12	12

	T/D/Polio/HepB	Pneu	MenB	MenC	MenACWY	FSME	Influenza	HepA	MMR	VZV	HPV ♀	HPV ♂
•	(10 J)								11 J	(•) ab 12 J	12 J	
•									4 J		12 J	
•											9 J	
•									6 J		11 J	
• (•)				(•) bis 24 J					(6 J)		11 J	
•		(•)			11 J				4 J	4 J	11 J	
•					14 J	≤ 8 J			3 J		12 J	
•					12 J				4 J		12 J	
•					11 J				5 J	5 J	11 J	
•											12 J	
• (12 J)											12 J	
• kein Pert									3 J		12 J	
•									9 J		12 J	
•									11 J		12 J	
6 J (6 J)					11 J	10 J	alle 5 J jährl.		(6 J) (8 J)		9 J	9 J
•									5 J		10 J	
•									6 J		10 J	
•											11 J	
• 11 J					11 J						11 J	11 J
• kein Polio									3 J	3 J	12 J	
•									4 J	4 J	12 J	

	T/D	Pa	Polio	HPV ♀	Pneu	FSME	Influenza	MMR	VZV
alle 10 J					65 J		65 J		(•)
					65 J		65 J		
alle 10 J	•				60 J		≥ 60 J		(•)
alle 10 J					50 J		65 J		(•)
alle 20 J	•	alle 20 J		(•)			65 J		(•) 65 J
alle 10 J	•			(•)	50 J		60 J		60 J
					65 J		65 J		70 J
					65 J		65 J		
alle 10 J					65 J		65 J		65 J
alle 10 J	alle 10 J	alle 10 J			65 J		65 J		
					65 J		55 J		
							60 J		
					65 J		65 J		
alle 10 J später alle 5 J	alle 10 J später alle 5 J	alle 10 J später alle 5 J			50 J	alle 5 J	•		50 J
alle 20 J später alle 10 J							65 J		65 J
alle 20 J					65 J		65 J		
alle 20 J	•						65 J		
65 J							65 J		
alle 10 J							65 J		

Legende

- : Allgemein empfohlene Impfung
- N : Allgemein empfohlene Impfung, im/ab dem Alter von N Monaten
- N : Allgemein verpflichtende Impfung
- 2 : Grundimmunisierung mit 2 Impfungen
- 3 : Grundimmunisierung mit 3 Impfungen
- : Zusätzlich Impfung während der Schwangerschaft
- 2 : MMR(V) nach dem 3. Geburtstag
- : Allgemein empfohlene Impfung, nicht vom Gesundheitssystem bezahlt
- : Nur in der Schweiz: ergänzende Impfung (keine Basisempfehlung)
- (N) : Catch-up-Impfung, falls vorher nicht erfolgt

Abkürzung Impfung gegen

- BCG Tuberkulose
- Rota Rotaviren
- T/D Tetanus/Diphtherie
- Pa Pertussis, azellulär
- Polio Poliomyelitis
- HepA Hepatitis A
- HepB Hepatitis B
- Pneu Pneumokokken
- MenB Meningokokken B
- MenC Meningokokken C
- MenACWY Meningokokken A, C, W, Y
- HPV ♀ Humane Papillomaviren f. Mädchen
- HPV ♂ Humane Papillomaviren f. Jungen

Quellen

s. hyperlinks hinter den Ländernamen (Abruf 21.09.2017)
<http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx>
 (Abruf 21.09.2017)



Diese Übersicht unterliegt folgendem Urheberrecht:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

Obwohl diese Übersicht mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann für ihre Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Sie kann und soll vor allem in keinem Fall das Beratungsgespräch mit einer qualifizierten Ärztin/einem qualifizierten Arzt ersetzen. Für eine verbindliche Auskunft über die jeweiligen Impfpfehlungen muss in jedem Fall die Originalveröffentlichung der jeweiligen Impfkommision herangezogen werden.